



Noteringen

Noteringen for slagtesvin er faldet 20 øre/kg, søer og orner er faldet 30 øre/kg. Beregnet smågrisenotering er faldet 8 kr./stk. ved 30 kg på grund af fald i slagtesvinenoteringen. Puljenoteringer er faldet ved Porc-Ex og Midt-Vest.

Danish Crown og Tican	
Slagtesvin	11,50
Søer	8,30
Orner	7,30
Polte	8,50
45-49,9 kg	
	7 kg 30 kg
SPF beregnet	225 426
Økologisk smågris	753
UK-tillæg	15 17
Antonius tillæg	23 37

Midt-Vest Pulje	205	380	
Nordjysk pulje konv.	214	385	
SPF pulje konv.	210	375	
SPF pulje -PRRS	250	400	
Porc-Ex pulje -PRRS			390
Porc-Ex pulje-ren blå			405
	Søer	Små-grise	Slag-te-Svin
Foderpriser	1,70	2,27	1,73
Kr./FE			
DB/gris		172	139
0-pkt.	245	412	11,89

Nyt fra slagterierne

Hos Danish Crown er den øvre vægtgrænsen fra på mandag 87,9 kg og fra mandag i næste uge 85,9 kg. Tican sænker vægtgrænserne en uge senere, således at denne i næste uge fortsat er 89,9 kg og herefter falder den 2 kg pr. uge de følgende 2 uger. Hos Tican får man kvalitetstillæg i vægtintervallet 77,0-83,9 kg i næste uge, men herefter falder dette også 2 kg pr. uge i 2 uger.

PED

Sygdommen PED har medført stigninger i de amerikanske future priser for svin. Den seneste svinetælling i Europa viser et fald på 2,9 procent søer i 2013 i forhold til 2012 og totalbestanden er faldet 1,6 procent.

I USA er mange besætninger ramt af PED, og denne virussygdom medfører pattegrisedødelighed på op til 100 procent. Amerikanske besætninger rammes på grund af dårlig smittebeskyttelse, og sygdommen viser sig efter en kort inkubationsperiode. Pattegrisene får vandigt diarre med dehydrering. Sygdommen er ikke i Danmark.

Minus 30 FE pr. gris

VSP lancerer et projekt hvor man i 50 besætninger, der har mindst 300 årssøer og hvor mindst halvdelen af slagtesvinene produceres færdig, vil kunne sænke foderforbruget i besætningen med 30 FE inkl. sohold pr. slagtesvin. Projektet skal køre i 2½ år i et samarbejde mellem besætningen og dennes rådgivere. VSP yder tilskud til rådgivningen på 50 procent. Interesserede kan henvende sig til SvinerådgivningDanmark på tlf. 7015 1200. Deltagelse vil medføre et intensivt rådgivningsforløb i projektperioden.

Staldindretning til smågrise og slagtesvin

Staldindretning baseres ofte på erfaringer fra eksisterende stalde, men enkelte forsøger sig med nyt, som f.eks.orstier med vægte. Kendetegnende er ofte at valgene sker ud fra et ønske om mindst mulig arbejdsindsats med den størst mulige effekt. Ved staldindretning er huskelisten lang og ønskelisten endnu længere.

1. Gode sygestier i hver sektion
2. Gyllekanaler med sump så der kan anvendes halm
3. Ventilation som forhindrer svineri på det faste gulv ved blandt andet at have åbent inventar foroven i stiskillerummene
4. Overdækninger skal kunne hæves fra 50 cm over gulvet og opad og et halmbræt foran hulen, så der kan fodres på gulv de første dage efter fravæning
5. Afstand mellem foder- og vandkrybbe ved slagtesvin for at holde god hygiejne og slagtesvin skal arbejde for at få foder ud, så der undgås foderspild
6. Ved vådfodring skal krybben være med rund bund, så foderet løber hurtigt ud til enderne
7. I smågrisestalde skal der både være gulvvarme og vægvarme
8. Overbrusning skal placeres over gødearealet i stien helt ud mod gangen og der skal være højtryksanlæg til vask, så det er hurtigt og effektivt at rengøre stalden.

Kilde Hyologisk, november 2013

Citronsyre

Der er gode erfaringer med tilsætning af citronsyre til foderet, hvis der er flåd fra søerne omkring løbning. Anvendes ren citronsyre kræver det en HACCP godkendelse af besætningen. Svinerådgivning Danmark kan være behjælpelig med at lave HACCP godkendelsen.

Vinterfodring

Hvis temperaturen i drægtighedsstalden er lavere om vinteren skal det kompenseres med op til 0,5 FE mere pr. so pr. dag.

Jern til pattegrise

Ved jerninjektion gives typisk en standarddosis på 200 mg. Dette rækker til ca. 5 kg tilvækst. Det vil sige at grise som vokser mere end 5 kg før de for alvor begynder at æde foder, vil komme til at mangle jern, og dyrlæge ved VSP Erika Busch foreslår ekstra jerntilskud i form af strøjern i sidste halvdel af dieperioden. Der er sjældent tale om blege grise, men det er påvist at et lavt niveau af jern har betydning for grisenes tilvækst i perioden efter fravæning.

Kornanalyser 2013

Årets kornanalyse viser at der er fundet 0,5 procent mere protein i byg og hvede, og der er fundet lidt mere fosfor i vinterbyg. Energiindholdet i vårbyg er steget med 2,3 FE i forhold til sidste år, og i vinterbyg med 0,7 FE pr. 100 kg. Forbedringen i kornets næringsindhold betyder for svineproduktionen en værdiforøgelse i vinterbyggen på 3,74 kr. pr. 100 kg og i vårbyggen 4,20 kr. og i hveden 1,07 kr. Hvis ikke besætningen har egne kornanalyser, anbefales at bruge de sidste 3 års gennemsnitstal for næringsindhold i optimeringen, og få tilpasset mineral- eller tilskudsblandingen, så indholdet i den færdige blanding lever op til normerne.

Kilde VSP notat 1334