



Noteringen

Noteringen for slagtesvin er faldet 20 øre. Søer og orner er faldet 60 øre/kg. Smågrise falder 8 kr. i beregnet notering i kommende uge. De fleste puljenoteringer på smågrise er uændret.

Danish Crown og Tican	
Slagtesvin	11,30
Søer	7,90
Orner	6,90
Polte	8,30
45-49,9 kg	
	7 kg 30 kg
SPF beregnet	252 419
Økologisk smågris	709
UK-tillæg	15 17
Antonius tillæg	23 37
Midt-Vest Pulje	220 410

Bette Gris	215	415	
Nordjysk pulje konv.	214	400	
SPF pulje konv.	215	410	
SPF pulje -PRRS	255	445	
Porc-Ex pulje -PRRS		455	
Porc-Ex pulje-ren blå		470	
	Søer	Smågrise	Slagtesvin
Foderpriser	1,74	2,30	1,74
Kr./FE			
DB/gris		160	127
0-pkt.	248	417	11,99

Antibiotika i sæd

Ornestation Mors fortæller at på grund af forårets problemer med omløbere ændrede man antibiotikatisætningen i sæden til en EU cocktail bestående af 4 forskellige typer antibiotika. Man ændrer nu igen og bruger fremover den oprindelige antibiotika cocktail bestående af 2 antibiotika. Det er den man holdte op med at bruge i ultimo 2012. Hatting KS har siden den 8. juli 2013 benyttet den oprindelige tokomponent antibiotika. Vær ekstra opmærksom på omløbere blandt de søer som gav problemer da ornestationerne i foråret kun anvendt en antibiotikatype i sæden.

Antibiotika til smågrise

Det almindelige øjemål er ikke en sikker metode til at bestemme vægten på en flok grise ved antibiotikabehandling. En korrekt vægtbestemmelse er grundlaget for korrekt dosering af antibiotika ved alle sygdomsbehandlinger. Nedennævnte tabel viser hvad grisene vejer et antal dage efter indsættelsen forudsat at tilvæksten fra 7-30 kg i e-kontrollen er beregnet til 450 gram pr. dag.

Tabel 1. Viser vægten dage efter indsættelse som en funktion af indsættelsesvægt: 450 gram tilvækst/dag 7-30 kg

		Dage efter indsættelse							
		7	14	21	28	35	42	49	56
Indvægt	6 kg	6,7	8,8	11,4	14,5	18,1	22,1	26,7	31,7
	7 kg	7,8	10,1	12,9	16,3	20,1	24,4	29,2	34,5
	8 kg	8,9	11,3	14,4	18,0	22,1	26,6	31,6	37,1
	9 kg	10,0	12,6	15,9	19,7	24,0	28,7	33,9	39,5

Hvis en sektion med 300 grise vurderes at veje 2 kg mindre end de reelt vejer og man dosserer medicin i henhold til den forventede vægt på f.eks. 20 kg betyder dette en underdossering på 9 procent. Tilsvarende eksempel kan dreje sig om at man vurderer 300 svin til at veje 15 kg, men de vejer i virkeligheden 13 kg. Fejl-skønnet på 600 kg levendevægt i stalden betyder en overdossering på 15 procent. Man kunne her reelt behandle 46 grise mere.

Fulde stalde

Stalde med miljøgodkendelse givet mellem 2002 og 2006 har mulighed for at udvide slagteproduktionen med ca. 10 procent, og man kan få lov at udvide smågriseproduktionen, hvis afgangsvægten er over 25 kg. For godkendelse givet fra januar 2007 til april 2011 vil det være muligt at øge slagtesvineproduktionen på 5 procent ved delvis fast gulv og 5½ procent ved drænet gulv. Smågriseproduktionen kan udvides med 4½ procent, mens soholdet ikke kan udvides.

Udvidelser baseret på stigende slagtevægt ved samme antal stipladser kan begrænses af krav til lugt, hvis der er naboer som der skal tages hensyn til. VSP har i notat nr. 1339 ajourført et regneark som kan bruges til at beregne de mulige ændringer og udvidelser under anmelderordningen.

Økonomi

Svineproducenternes driftsresultat i 2013 forventes at blive lavere end 2012, der ganske vist var det bedste resultat i mange år. I 2013 bliver foderomkostningerne højere end i 2012, og noteringen forventes at holde niveauet fra 2012. I 2014 forventes lavere foderomkostninger. Prognosen fra VSP fortæller at det middelmådige resultat i 2013 nærmer sig et højt niveau for smågriseproducenterne og de integrerede producenter i 2014. Til gengæld skal slagtesvineproducenterne forbedre indtjeningen for at komme op på et tilfredsstillende niveau.

Mere kontrol

Fra 1. januar 2014 vil der blive indført uanmeldte besøg i Danish Ordningen. Det er et krav fra det tyske kvalitetssystem, der får VSP til at stramme ordningen. Det betyder at man som svineproducent ikke kan sige "nej tak", når kontrolløren fra Baltic Control banker på døren for at lave den sædvanlige gennemgang af produktionen.

Foderudnyttelse

Det gælder om at fodre grisen, så der dannes så lidt fedt som muligt. Det kræver langt mindre foder at danne 1 kg kød end 1 kg fedt. Når grisen hver dag er færdig med at danne kød, vil yderligere foderoptag gå til at danne fedt. Kan man derfor reducere grisens foderoptag og primært opnå køddannelse giver det grisen den bedste foderudnyttelse. Jo mindre partikler foderet indeholder, jo større overflader har foderet, og jo bedre kan fordøjelsesenzymerne fordøje og optage foderet. Det giver lavere foderforbrug. 80-85 procent af foderpartiklerne bør være under 1 mm i størrelse. Tørfoderautomater skal indstilles, så der kun ligger en smule foder under hver automat, og denne indstilling skal justeres dagligt. Grisene må gerne arbejde for at få foder ud, og falder der noget ved siden af, skal det kunne samles op. Det kan være nødvendigt at lukke nogle af spalterne foran foderautomaterne med spal-telukkere for at reducere foderspildet. Er der restriktiv vådfoder, er det en fordel at kønssortere og give sogrisene en hårdere slutfoderstyrke end galtgrisene.

Det er meget vigtigt at grisene ikke fryser ved indsættelse, så udtørring og opvarmning af stalden til 20 grader er meget vigtig før grisene ankommer.

Udsætterstrategi

Første kulds søer må aldrig udsættes på grund af dårlige fravænningsresultater. Har 2. til 4. kulds søer to dårlige farings- eller fravænningsresultater bør de udsættes. Ved 5. til 12. kulds søer skal man udsætte dyr med de dårligste farings- eller fravænningsresultater.

Hvis investeringer i polte skal være rentabelt, viser undersøgelser at det først skal være efter 7. eller 8. læg at søerne udsættes. Hvis søerne allerede i 7. læg eller derunder præsterer dårligere end 1. lægs søerne, skal der ses på managementmæssige faktorer. Polte skal vurderes på bentøj, kondition, et højt indeks og temperament. Stressede og aggressive dyr skaber uro i besætningen. Uanset om man bruger naturlig brunststimulering med orne eller anvender f.eks. Altresyn skal det ønskede antal polte der skal bruges til ugeholdet aktiveres ca. 26 dage før forventet løbning. Det er derfor for sent at vente med at vurdere sine søer i forbindelse med tilmelding til slagteriet ca. 1 uge før fravænnings. Som udgangspunkt har man investeret i enhver so da den var polt og jo længere soen kan være produktiv i besætningen, jo mere rentabel har investeringen været.

Kilde Hyologisk, december 2013

Staldleje

Soanlæg beliggende i Vendsyssel søges til leje. Gerne med 30 kg produktion. Minimum 400 årssøer. Henvendelse FM Landbrug tlf. 51364376.

Staldanlæg til slagtesvin med minimum 1.000 stipladser ønskes lejet i Midtjylland. Henvendelse Brian Larsen, Skæve, tlf. 40522258.