



Noteringen

Noteringen for slagtesvin, søer og orner falder 20 øre/kg i kommende uge. Beregnet smågrisenotering falder 8,35 kr./stk. ved 30 kg. De fleste puljenoteringer på smågrise falder 10-25 kr.

Danish Crown og Tican	
Slagtesvin	10,00
Søer	7,00
Orner	6,00
Polte	7,00
45-49,9 kg	
	7 kg 30 kg
SPF beregnet	214 364
Økologisk smågris	715
UK-tillæg	15 17
Antonius tillæg	18 39

Midt-Vest Pulje	205	385	
Nordjysk pulje konv.	199	375	
SPF pulje konv.	195	380	
SPF pulje -PRRS	230	400	
Porc-Ex pulje -PRRS			430
Porc-Ex pulje-ren blå			435
	Søer	Små- grise	Slag- te- Svin
Foderpriser Kr./FE	1,74	2,30	1,74
DB/gris		106	76
0-pkt.	247	416	11,96

Sojaskrå er steget

Agromarkets har berettet om stigende priser på sojaskrå, og landmændene er derfor blevet tilrådet at købe sojaskrå eller tilskudsfoder fra august 2014 til februar 2015. Allerede nu er de stigende priser slået igennem, men har du ikke sikret forsyningen kan det være en ide at kontakte foderfirmaet for at høre om mulighederne.

Huldstyring

Stigende foderforbrug i soholdet skal kontrolleres ved at arbejde aktivt med huldvurdering. Man skal droppe hyppige, overfladiske huldvurderinger, og i stedet lave få, men grundige vurderinger af søernes huld. Det kræver 3-4 FE ekstra til en so for at give et kg tilvækst, og der er ikke en mærkbar effekt af dette, hverken på 1 eller 2 uger.

Huldvurderinger skal ske på følgende tidspunkter

1. Ved fravæning
2. 4 uger efter løbning
3. Efter 70 dages drægtighed
4. Ved faring, hvor effekten af huldstyringen vurderes.

Huldvurdering kan gøres med en rygspækmåler.

Vask af lastbiler

På grund af fund af afrikansk svinepest i vildsvin i Polen og Litauen er eksport til Rusland stoppet, og svinenoteringen i Danmark er faldet dramatisk. For at undgå svinepest kommer til Danmark skal eksportlastbiler både vaskes når de har læsset klovbærende dyr af i f.eks. Polen og Litauen, og de skal nu også rengøres og desinficeres når de kommer retur til Danmark.

2014 – smågrisenes år

Fravænningsvægten er mange steder under 7 kg i gens. og de mindste i holdet vejer under 6 kg. Disse grise kræver specielt foder og særlig god pasning. Selvom diegivningstiden er stabil på 28-30 dage beregnet i e-kontrollen er mange af grisene fravænnede til ammesøer, så den reelle fravænningsalder ofte er nede på 23-24 dage. De små og tidligt fravænnede grise skal gå længere tid i klimastaldene inden de skifter fra foderblanding 1 til blanding 2.

Grisenes største behov er foder, varme og vand. Ordentlig udtørring efter rengøring og overdækning med forlængede kanter mod gulvet eller hundehulsplader foran overdækningen hjælper grisene til at holde varmen. Og gulvvarmen kan nogle gange slukkes tidligere, når grisene selv varmer "sovekabinen" op.

Smågrisediarre

Der er stigende opmærksomhed overfor landmænds flokbehandling med antibiotika. Der kommer muligvis krav om obligatorisk diagnostik til bekræftelse af rutinemæssig flokbehandling med antibiotika. Flokbehandling er ofte mod tarmlidelser, men kan også være foderrelateret. Drøft med dyrlægen om I skal tage en sok på støvlen og gå rundt i stien og sende den beskidte sok med posten til undersøgelse på laboratoriet. Så kan man finde ud af bakterieniveauet. Hvis sokkeprøven viser et lavt niveau, kan man oprette et vejehold og finde ud af hvornår tilvæksten går i stå og måske her tilrette foderet.

Kilde Hyologisk februar 2014

Hvor rent er der i dit køkken?

Ja, det er grisenes køkken, det drejer sig om; foderladen. En ordentlig hygiejne i foderladen, og også helt ud i krybben, giver bedre foderøkonomi, reduceret risiko for døde grise, diarre, endetarmsudfald og gaspustere og i sidste ende bedre dyrevelfærd!

Hvis du ikke allerede har indført rutiner i foderladen med hensyn til rengøring af udendørs siloer, mølle, dysefilter, tør-/vådfoderblander, mineral-/fiskemelspåslag, fedtanlæg, færdigvarersiloer, sneglerender, redlere, optagestationer, foderautomater, nedfaldsrør, foderstreng, buffersiloer, transportvogne og udstyr – ja så er det bare om at komme i gang. Lav en rengøringsplan således de ansvarlige medarbejdere får overblik og systematik i rengøringen. Det giver også en evt. kontrollant en tro på at det gøres regelmæssigt og dermed en "stjerne i bogen".

Læs mere om emnet i Fagbladet SVIN Februar s. 26-27 eller kontakt din lokale fodderrådgiver i Herning på 7015 1200 eller Brønderslev på 9624 1881.

Halmhæk til farestier

Enkelte svineproducenter har monteret en lille halmhæk over krybben, hvor det har været muligt i forhold til foderrør og vandrør.

Krybben fyldes med halm ca. 3 gange om ugen. Enkelte søer specialiserer sig i at trække al halmen ud i løbet af meget kort tid, men generelt er der permanent halm i halmhækken.



Foto AP