



### Noteringen

Noteringen for slagtesvin, søer og orner samt beregnet smågrisenotering er uændret i næste uge. Puljenoteringer falder 5-20 kr.

Danish Crown og Tican	
<b>Slagtesvin</b>	11,90
<b>Søer</b>	9,00
<b>Orner</b>	8,00
<b>Polte</b>	8,90
45-49,9 kg	
	<b>7 kg</b> <b>30 kg</b>
<b>SPF beregnet</b>	267    445
<b>Økologisk smågris</b>	781
<b>UK-tillæg</b>	15    17
<b>Antonius tillæg</b>	24    40

<b>Midt-Vest Pulje</b>	215	400	
<b>Nordjysk pulje konv.</b>	214	400	
<b>SPF pulje konv.</b>	210	385	
<b>SPF pulje -PRRS</b>	250	420	
<b>Porc-Ex pulje -PRRS</b>			425
<b>Porc-Ex pulje-ren blå</b>			440
	<b>Søer</b>	<b>Små-grise</b>	<b>Slag-te-Svin</b>
<b>Foderpriser</b>	1,67	2,34	1,71
<b>Kr./FE</b>			
<b>DB/gris</b>		191	157
<b>0-pkt.</b>	243	413	11,85

### Økonomisk prognose 2012-2015

VSP har udarbejdet en prognose, som konstaterer et tilfredsstillende driftsresultat i 2012, men det forventes, at i 2013 bliver foderomkostningerne højere end i 2012, og noteringen forventes at være på samme niveau. Derved er der et fald i driftsresultatet, som hovedsagelig skyldes negative konjunkturer. Den bedste 3-del har et markant forspring i forhold til gennemsnittet, og man påviser at bedste 3-del blandt slagtesvineproducenterne tjener ca. 1 mio. kr. mere end gennemsnittet. En tilsvarende analyse for soholderne viser en indtjeningsforskel på 1,5 mio. kr.

I 2014 forventes yderligere prisfald på korn og soja, og ved en normal høst skulle dette give lavere priser på foder. Noteringen forventes uændret og puljenoteringen forventes at ligge 20 kr. over den beregnede notering.

### Driftsresultat

Størstedelen af faldet i driftsresultatet i 2013 skyldes konjunkturer, idet der i 2012 var en positiv konjunktur på 238.000 kr. og i 2013 forventes en negativ konjunktur på 175.000 kr. ved slagtesvineproducenterne.

<b>Sohold</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Årssøer	704	725	747
Hektar	154	154	157
Driftsresultat 1.000 kr.	893	497	1.033
Likviditet før investeringer 1.000 kr.	962	1.179	1.504

<b>Slagtesvin</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Solgte slagtesvin	8.595	9.025	9.476
Hektar	160	160	163
Driftsresultat 1.000 kr.	838	268	488
Likviditet før investeringer 1.000 kr.	631	690	717

### **Slagmærker?**

En landmand var ved at drive grise ud til vognmanden, og uheldigvis fik grisene lukket døren til udleveringspladsen. Landmanden gik derfor gennem flokken og havde et drivbræt i hånden, men kom undervejs til at ramme 3 grise på ryggen med drivbrættet. Det var ikke hans hensigt at skade grisene, men han var ved at snuble i den tætpakkede flok. 3 uger efter hændelsen har landmanden fået en orienteringsskrivelse fra Veterinærkontrollen på slagteriet, hvoraf fremgår at han er meldt til politiet for dyremishandling, og sagen vil blive indberettet som en overtrædelse af krydsoverensstemmelsesreglerne.

Danmark er det eneste land i EU, hvor forhold konstateret på slagteriet, kan medføre fradrag i hektarstøtten. Landbrug & Fødevarer arbejder på at få dette forhold ændret, så det heller ikke skal kunne give fradrag i Danmark.

### **Diarre**

Påvisning af diarre hos både enkelte og flokke af grise har betydning for igangsætning af antibiotikabehandling. Alle grise med gødningstilsmudsning af bagparten og rødme af endetarmsområde bør behandles mod diarre. Herudover bør alle grise der observeres med grødet/vandigt gødningskonsistens behandles mod diarre. Behandling af diarre på flokniveau bør derfor indledes når der i gennemsnit er 1 til 3 klatter pr. sti i en sektion med 18-50 grise pr. sti.

*Kilde VSP rapport nr. 42*

### **Punktudsugning**

I Holland og Tyskland er der i mange stalde punktudsugning under gulvet i gyllekanaler for at føre den mest snavsede luft direkte til luftrensning. Det forventes også at komme på teknologilisten i Danmark over de ting som svineproducenter kan gøre for at få lov til at bygge en ny stald. Det anbefales derfor at forberede til punktudsugning af nye stalde, således at ca. 10 kubikmeter pr. time pr. dyr kan gå den vej. Fra luftrenseren på loftet føres f.eks. rør ned i stien langs væggen 2 cm under gulvhøjde og gennem dette rør suges en del af ventilationsluften. Det er vigtigt at sikre sig at udsugningspunktet ikke kan blive fyldt med gylle, selvom der ved et uheld kommer gylleoversvømmelse i stien. Derfor bør udsugningspunkterne ikke ligge som vandrette rør øverst i gyllekanalen.

### **Rene siloer og rørstreng**

Salmonella, mugnyrer, endetarmsfremfald og nogle af fællesnævnerne på problemerne når siloer og rørstreng ikke holdes rene. Med en speciel indrettet kloakrenser er det muligt at rengøre disse, når man har husket at lukke hullet op til foderkæden. Nogle rengør fodersiloerne mindst hver 3. måned, og andre kan ikke huske de sidst har set ind i dem. Det anbefales at få lavet et hul, når siloerne er tømt, og med forsigtighed kigge ind med en lommelygte, og så bagefter overveje hvordan man får gjort rent i siloen (det kan være farligt at kravle derind). En af årsagerne til for højt foderforbrug kan være dårlig foderhygiejne.

## **CO<sub>2</sub> i pattegrisehule**

For at give ekstra varme i smågrisehjørnet har nogle sat en afskærmningsplade foran hulen, så grisene kun kan komme ud gennem et hundehul. Det har været undersøgt om CO<sub>2</sub> niveauet herved kunne blive for højt. Man har målt CO<sub>2</sub> niveauet i stalden til 1.000 PPM, og i hulen var det 1.800 PPM. Det skønnes at det kritiske niveau er 3.000 PPM. Grænsen for hvad vi mennesker kan tåle er ca. 5.000 PPM. Der er derfor ingen risiko for pattegrisene, selvom de er lukket inde i pattegrisehulen.

*Kilde VSP fagligt nyt*

## **Kuldtilvækst**

Har du tænkt over at kuldtilvæksten pr. diegivningsdag er ca. 2,5 kg med en variation fra 2 kg til 3,5 kg. Kuldtilvæksten pr. dag gange 4 er lig med soens gennemsnitlige daglige mælkeydelse, og denne topper når grisene er ca. 17 dage gamle. Supplerende rent vand til pattegrise givet i et trug kan øge grisenes tilvækst.